

兵庫県のり漁場環境情報 (神戸市、東浦海域 5 号)

海域全般にレプトシリンダラス・キートセロス等の小型珪藻が確認され、東浦地先でやや多い状況です。そのため、窒素は神戸地先・沖で概ね $1 \mu\text{g-at/L}$ 台、東浦地先で $1 \mu\text{g-at/L}$ 以下となっています。

(水温) 神戸地先は平均 10.4°C 、神戸沖は平均 10.2°C 、東浦地先は平均 10.3°C 。

(塩分) 神戸地先： $32.46\sim32.83\text{psu}$ 。神戸沖： $32.60\sim32.88\text{psu}$ 。東浦地先： $32.49\sim32.57\text{psu}$ 。


(珪藻・栄養塩)

海域全般にレプトシリンダラス・キートセロス等の小型珪藻が確認され、東浦地先ではレプトシリンダラス・夜光虫、1-①駒ヶ林ではキートセロスがやや多く確認された。また、東浦地先では小型珪藻がやや多く発生している影響で、リンの値が大きく低下していた。

		前回値	今回値	平年値	昨年値
神戸地先	水温	8.6	10.4	11.2	9.7
	窒素	3.4	1.9	2.1	1.0
	リン	0.12	0.22	0.18	0.13
神戸沖	水温	8.5	10.2	11.0	9.6
	窒素	0.8	1.4	1.7	1.4
	リン	0.11	0.24	0.21	0.22
東浦地先	水温	9.0	10.3	11.0	9.8
	窒素	1.8	0.6	1.4	0.8
	リン	0.35	0.12	0.19	0.17

(2/13)

(3/21)



栄養塩 (窒素) 図

2026年 3月18日調査

満潮～下げ潮 (東流)

調査時間； 8:04～10:22

